



UN MOIS → une espèce



**MENEZ
L'ENQUÊTE!**



BARBIER SIMON

La Coccinelle à damier

OÙ LA CHERCHER?

Cette espèce montre un intérêt pour la strate herbacée sans pour autant négliger les arbres et arbustes, essentiellement les feuillus. Elle peut être trouvée dans les zones urbaines végétalisées comme les jardins, les haies mais aussi les lisières forestières, les prairies et les pâtures non traitées. Bien que l'espèce soit facilement visible à vue par ses couleurs, il est possible de faciliter son observation en utilisant la technique du parapluie japonais (qui consiste à secouer les branches d'arbres) ou du fauchage de la végétation herbacée.

QUE MANGE-T-ELLE?

Larves et adultes se nourrissent principalement de pucerons, ce qui en fait d'excellents auxiliaires pour le jardinier ! Elle semble apprécier principalement les pucerons sur les Fabacées (Légumineuses) et sur les chardons.

ACTION DE CONSERVATION

Cette coccinelle est largement répartie dans la région, même si on ne la rencontre jamais en grand nombre. La disparition importante des prairies, pâtures, jachères ainsi que l'usage important des produits phytosanitaires lui est sans aucun doute préjudiciable. La mise en place de zones en "libre-évolution" sans fauche systématique des milieux ouverts comme les bords de route et de champs, friches ou jardins, sont des actions simples à mettre en œuvre pour favoriser cette espèce.

RISQUES DE CONFUSION

Comme son nom français l'indique, la forme des points sur ses élytres est caractéristique et le plus souvent suffisante pour identifier l'espèce. Parfois les points n'étant pas assez anguleux, il faut se référer à leur disposition qui n'est pas identique avec les autres espèces.

ORDRE : COLEOPTERA

Nom vernaculaire :

Coccinelle à damier

Nom latin :

Propylea quatuordecimpunctata

Nom Picard :

Bête à bon Dieu

Menace:

LC Préoccupation mineure
(LISTE ROUGE HAUT-DE-FRANCE 2025)



LE SAVIEZ-VOUS ?

Beaucoup d'espèces de coccinelles sont utilisées en lutte biologique, pour se défendre contre les pucerons, les acariens ou les psylles. Parmi les 120 espèces présentes en France, 21 ont été introduites pour cette raison. Mais d'autres pays font la même chose avec nos espèces indigènes, c'est le cas des États-Unis, qui ont introduit la Coccinelle à damier pour lutter contre un puceron présent sur le sorgho.



BARBIER SIMON

La larve de Coccinelle à damier



DES POINTS ANGULEUX DISPOSÉS EN DAMIER

COLORATION JAUNE ET NOIRE

Comparaison de la Coccinelle à damier et de la Coccinelle à 22 points

BARBIER SIMON

Je contribue sur enquetes.clicnat.fr clicnat

PICARDIE NATURE

233 rue Eloi Morel - 80000 Amiens

Tél. 03 62 72 22 53 | www.picardie-nature.org



Cofinancé par l'Union européenne



Les actions menées par Picardie Nature sont soutenues par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l'aide de différents partenaires.