

Strate du support principal	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Support plante(s) principale(s)	Support plante(s) secondaire(s)	
Arborée	<i>Scymnus auritus</i> (Westman in Thunberg, 1795)		Chêne (45)	/	
	<i>Lindorus forestieri</i> (Mulsant, 1853)		Chêne (7)* <sup>2</sup>	Houx (3)* <sup>2</sup>	
	<i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelles des landes	Cyprès (186)	Thuya (21), Genévrier (11)	
	<i>Lindorus lophanthae</i> (Blaisdell, 1892)		Cyprès (72)	Fusain (11), Thuya (6), Genévrier (6)	
	<i>Aphidecta oblitterata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à virgule	Epicéa (82)	Pin (19), Cèdre (17)	
	<i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761)		Erable (115)	Houx (21), Charme (16), Frêne (14)	
	<i>Calvia decemguttata</i> (Linnaeus, 1767)	Calvia à 10 points blancs	Erable (25)	Houx (15), Charme (15), Tilleul (15)	
	<i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Grande coccinelle orange	Erable (66)	Houx (21), Charme (17), Frêne (17)	
	<i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba, 1791)	Coccinelle des saules	Fusain (54)	Cyprès (28)	
	<i>Nephus bipunctatus</i> (Kugelann, 1794)		Haie de Hêtre (38)	/	
	<i>Myrrha octodecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle des cimes	Pin (135)	/	
	<i>Harmonia quadripunctata</i> (Pontoppidan, 1763)	Coccinelle des pins	Pin (189)	Epicéa (25), Cèdre (11)	
	<i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle ocellée	Pin (5)	Epicéa (4)	
	<i>Scymnus suturalis</i> (Thunberg, 1795)		Pin (54)	/	
	<i>Myzia oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle zébrée	Résineux (Cèdres (27)* <sup>2</sup> , Pin (22)* <sup>2</sup> )	/	
	<i>Eoxochomus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à virgule	Résineux (Cyprès (195), Epicéa (55), Pin (62))	Genévrier (32), Haie de Hêtre (30)	
	<i>Sospita vigintiguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle de l'aulne	Ripisylve d'Aulne (* <sup>2</sup> )	/	
	<i>Scymnus oertzeni</i> (Weise, 1886)		Sapin (* <sup>2</sup> )	Epicéa (1)	
	<i>Scymnus ferrugatus</i> (Moll, 1785)		Strate arborée (Aulne glutineux (5)* <sup>1</sup> ) et arbustive	/	
	<i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Adalie à 10 points	Tilleul (123)	Erable (44), Epicéa (33), Chêne (33), Haie de Charme (24), Bouleau (17)	
	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Coccinelle asiatique	Tilleul (160)	Erable (101), Bouleau (55), Pin (51)	
	<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Calvia à 14 points blancs	Tilleul (43)	Erable (14)	
	<i>Stethorus pusillus</i> (Herbst, 1797)	Coccinelle tête d'épingle	Tilleul (50)	Haie de Hêtre (46), Chêne (21), Haie de Charme (15)	
	<i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Adalie à 2 points	Tilleul (85)	Erable (25), Bouleau (17), Pin (18)	
<i>Oenopia conglobata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle rose	Tilleul (88)	Erable (42), Chêne (37)		
Arbustive	<i>Henosepilachna argus</i> (Geoffroy, 1785)	Coccinelle de la bryone	Bryone (94)* <sup>1</sup>	/	
	<i>Coccinella undecimpunctata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle à 11 points	Cyprès jaune (dans cimetière) (24)	Buis (15), Genévrier (8)	
	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à 22 points	Haie de Charme (103) et Erable (93)	Chélidoine (45), Graminées (48), Haie de Hêtre (45), Cornouiller (14)	
	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à damier	Haie de Erable (54)	Tilleul (47), Haie de Hêtre (43), Armoise (35), Haie de Charme (28)	
	<i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Herbst, 1792)	Rhyzobie des arbres	Haie de Hêtre (132)	Lierre (76), Pin (71), Cyprès (62)	
	<i>Scymnus haemorrhoidalis</i> (Herbst, 1797)		Haie de Hêtre (23)	Buis (7)	
	<i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1777)		Haie de Hêtre (49)	Lierre (38), Chélidoine (30), Haie de Charme (23)	
	<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle à 7 points	Haie de Hêtre (57)	Chardon (56), Cyprès (53), Pin (45), Erable (40), Ortie (42)	
	<i>Scymnus interruptus</i> (Goeze, 1777)		Lierre (108)	Haie de Hêtre (56), Buis (31), Chélidoine (29), Haie de Charme (24)	
	<i>Nephus quadrimaculatus</i> (Herbst, 1783)		Lierre (39)	Tilleul (4)	
	<i>Platynaspis luteorubra</i> (Goeze, 1777)	Coccinelle fulgurante	Pin (12)	Lierre (11), Haie de Hêtre (10), milieu ouvert à Cirses * <sup>5</sup>	
	<i>Scymnus subvillosus</i> (Goeze, 1777)		Plantes ornementales (* <sup>2</sup> )	Chêne (2)* <sup>2</sup> , Lierre (1), Bouleau (1)	
	<i>Scymnus limbatus</i> (Stephens, 1832)		Saule rampant (3)	/	
	<i>Hyperaspis</i> sp. * <sup>4</sup>		Houx et Pêcher de vigne (* <sup>2</sup> )	/	
	Herbacée	<i>Coccidula rufa</i> (Herbst, 1783)	Coccidule des marais	Carex (21)	Phalaris (3)
		<i>Coccinella quinquepunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à 5 points	Chardon (* <sup>2</sup> )	Ronce (1), Achillée (1), Tilleul (1), Orme (1), Lierre(1)
<i>Rhyzobius litura</i> (Fabricius, 1787)		Rhyzobie des friches	Graminées (132)	Végétation basse (Chardon (53), Armoise (35), Chélidoine (21), Ortie (19))	
<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1760)			Graminées (161)	Chardon (22), Cyprès (17), Haie de Hêtre (14)	
<i>Clitostethus arcuatus</i> (Rossi, 1794)			Grande Chélidoine (108)	Lierre (34)	
<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze, 1777)		Coccinelle des friches	Matricaire (14)	Armoise (12), Chénopode blanc (7), Achillée millefeuille (7), Chardon (7)	
<i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)		Coccinelle des roseaux	Phalaris (4)	Roseaux (3), Carex (3)	
<i>Hippodamia tredecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)		Coccinelle à 13 points	Pulicaire (2)	Végétation basse (Chardon (1), Graminées (1), Cresson (1), Ortie(1))	
<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunktata</i> (Linnaeus, 1758)		Coccinelle à 24 points	Saponaire Officinale (* <sup>2</sup> ) et Strate herbacée (* <sup>2</sup> )	Saule (1), Armoise (1)	
<i>Coccidula scutellata</i> (Herbst, 1783)		Coccidule tachetée	Typha (1)	Roseaux (1)	
<i>Nephus redtenbacheri</i> (Mulsant, 1846)			Végétation basse (Graminées (* <sup>1</sup> ))	/	
<i>Scymnus</i> sp. groupe <i>Apetzi</i> * <sup>3</sup>			Végétation basse (Graminées, Plantes à fleurs)	/	
Autre		<i>Coccinella magnifica</i> (Redtenbacher, 1843)	Coccinelle des fourmières	A proximité des dômes de fourmis du genre <i>Formica</i> , en ambiance forestière	

Le tableau a été réalisé sur un ensemble de 11 251 données issues de Clicnat (jusqu'au 15/03/2021) et récoltées dans la région Picardie par Gilbert TERRASSE. Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre d'observations sur la plante.

\*<sup>1</sup> Issue de la littérature : Les coccinelles du Pas-de-Calais (Façon & Terrasse, 2015)

\*<sup>2</sup> Issue de la littérature : Les coccinelles du Maine et Loire (Durand, 2015)

\*<sup>3</sup> Scymnus Groupe apetzi : *Scymnus frontalis* (Fabricius, 1787), *Scymnus suffrianioides* (Sahlberg, 1913), *Scymnus bivulnerus* (Capra & Fürsch, 1967), *Scymnus apetzi* (Mulsant, 1846), *Scymnus schmidti* (Fürsch, 1958) et *Scymnus rufipes* (Fabricius, 1798)

\*<sup>4</sup> Complexe *Hyperaspis* : *Hyperaspis campestris* (Herbst, 1783), *Hyperaspis concolor* (Suffrian, 1843), *Hyperaspis pseudopustulata* (Mulsant, 1853)

\*<sup>5</sup> Milieu à Cirses : Communication personnelle de Bruno Derolez (avril, 2020)

